CEFIXIME

OROKEN PDR SUSP 40MG NOURRISSON (CEFIXIME)
OROKEN PDR SUSP 100MG ENFANT

la Commission considère que le service médical rendu par les spécialités OROKEN reste important dans les indications thérapeutiques suivantes :

.

OROKEN NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable et OROKEN ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

- Pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentérale d'au moins 4 jours
- Infections urinaires basses chez l'enfant de plus de 3 ans en dehors des états infectieux sévères.

La Commission considère que le service médical rendu par les spécialités OROKEN reste insuffisant dans les indications thérapeutiques suivantes :

OROKEN NOURRISSONS 40 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable et OROKEN ENFANTS 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable

- Infections bronchiques et pulmonaires
- Otites moyennes aiguës, notamment récidivantes

CEFPODOXIME

CEFPODOXIME 40MG PDR 50ML NOURRISSON
CEFPODOXIME 40MG PDR100ML ENFANT
ORELOX GLE SUSP BUV 40MG 100D
ORELOX GLE SUSP BUV 40MG 200D

la Commission considère que le service médical rendu parles spécialités ORELOX ou CEFPODOXIME reste : Important dans les indications suivantes :

- Otites moyennes aiguës ;
- Angines documentées à streptocoque A ß-hémolytique ;
- Sinusites ;
- Exacerbations des bronchopneumopathies chroniques obstructives, en particulier lors de poussées itératives ou chez les sujets à risque ;

Insuffisant dans les indications :

- Pneumonies communautaires ;
- Bronchites aiguës.